Zorgpad Osteoporose

Instroom

Diagnostiek

Behandeling en follow-up

Presentatie op SEH

Presentatie via radiologie
Bij observatie inzakkingsfractuur

Geen zorgpad
- Fractuur zonder relatie osteoporose*
- Onderliggende maligniteit**
- <1 jaar gestart met bisfosfonaat
- <1 jaar geleden DEXA
- <1 jaar levensverwachting

Opstarten zorgpad osteoporose
Order DEXA-scan

Nalopen 1x per maand fractuurlijst zodat er geen DEXA's gemist worden

* Fractuur zonder relatie osteoprose: aangezicht, schedel, vingers, tenen, cervicale wervelkolom en ernstig ongeval (zoals multitrauma, val van grote hoogte).

** overleg oncoloog

Heupfractuur >75 jaar

Opname en starten medicatie
VS
- Behandeling met zoledroninezuur volgens protocol.

Zie iDoc: **Zolendroninezuur iv tijdens opname voor heupfractuur**

Einde zorgpad

DEXA-scan

DEXA-scan normaal

DEXA-scan

Consult
Chirurg
Uitslag DEXA-scan

Heupfractuur 50-75 jaar

Overige fractuur >50 jaar

Wervelinzakking ≥ Graad 2

Postoperatief — **Lab 1**

Indien T-1,0 — **Lab 1**

Indien T-1,0 — **Lab 1**

Lab 2

Lab 1:Serum calcium, albumine, creatinine, TSH en 25(OH)D

Lab 2: Serum calcium, albumine, creatinine, TSH en 25(OH)D, bezinking, M-proteïne, fosfaat, serum alkalische fosfatase, anti-tissue Transglutaminase

Stop

Follow-up: controle osteoporose poli
VS
TC of e-consult BD

1 jaar na ziekenhuisopname voor vervolgbehandeling indien geïndiceerd m.u.v. hoogbejaarde patiënten en/of verpleeghuisbewoners. Vervolgbehandeling van osteoporose wordt overgedragen aan specialist ouderengeneeskunde of huisarts.

Consult osteoporose poli
VS
TC of e-consult BD
- Uitslagen lab
- Bespreken diagnose en beleid
- Uniforme instructie inname medicatie
- Bespreken therapietrouw

Follow-up: controle osteoporose poli
VS
TC of e-consult BD
- Controle therapietrouw

Frequentie: een paar weken na starten medicatie, indien goede respons over op jaarlijkse controle

Taken osteoporose poli
- Inschatting valrisico en interventies
- Medicatie evaluatie
- Voeding en leefstijlafdvies
- Calcium/vitamine D

Consult
Internist
Fysiek
- Uitslagen lab
- Bespreken diagnose en beleid
- Uniforme instructie inname medicatie
- Bespreken therapietrouw

Binnen 8 weken na presentatie op SEH

Follow-up: controle
Internist
Fysiek
- Controle therapietrouw

Frequentie: 2 maanden na starten therapie, daarna halfjaarlijks

Botvormende therapie

Romosozumab

1 2

1. Lab

2. Controle consult
Internist
Telefonisch/digitaal

3 en 6 maanden na starten therapie

1 2 3

1. Lab

2. DEXA-scan

3. Controle consult
Internist
Fysiek (CP)

12 maanden na starten therapie

Stop

Teriparitide

1 2

1. Lab

2. Controle consult
Internist
Telefonisch/digitaal

2, 8 en 14 maanden na starten therapie

1 2 3

1. Lab

2. DEXA-scan

3. Controle consult
Internist
Fysiek (CP)

12 maanden na starten therapie

Stop

Legenda

- Stap zonder patiënt
- Consult
- Behandeling / Ingreep / Actie
- Overgang naar ander pad / fase / specialisme
- Herhaling (meerdere consulten/ behandelingen/acties)

Ikazia ziekenhuis